



<岡崎市予防接種スケジュール表>

岡崎市では下記の予防接種を実施しています。(制度改正により変更する場合がありますので毎年確認してください)

今後、対象年齢にあわせて随時接種券を送付します。接種券には使用期間があります。内容を確認の上、早めに接種をしましょう。



岡崎市健康・食育キャラクター
まめ吉

		2	3	5	6	8	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	料金		
		カ	カ	カ	カ	カ	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳			
		カ	カ	カ	カ	カ	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳			
定期接種	ロタ	<p>1価(ロタリックス)：標準的な接種として、初回接種は生後2か月から開始。27日以上の間隔で2回接種。(接種期間終了日は24週まで)</p> <p>5価(ロタテック)：標準的な接種として、初回接種は生後2か月から開始。27日以上の間隔で3回接種。(接種期間終了日は32週まで)</p> <p>(注：初回の標準的な接種期間) ※どちらのワクチンも初回接種は14週6日までに受けることが推奨されています。</p>																								無料	
	小児用肺炎球菌	標準的な接種として、初回接種を27日以上の間隔で3回接種(1歳未満)後、60日以上あけて追加接種を1回接種(1歳以上) ※初回接種開始月齢により接種方法が異なります。																									
	B型肝炎	標準的な接種として、27日以上の間隔で2回。接種後3回目は、1回目の接種から139日以上あけて1回接種																									
	五種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ)	1期	1期初回接種を20日から56日までの間隔で3回接種後、6か月以上経過したのちに1期追加接種を1回接種。 ※既にヒブ、四種混合ワクチンの接種歴がある方は担当までご連絡ください。																								
	BCG																										
	二種混合 (ジフテリア 破傷風)	2期																									
	麻しん 風しん (MR)	1期																									
		2期	小学校就学前の1年間(年長児の4/1~3/31)																								
	水痘(水ぼうそう)		標準的な接種として、6月から12月の間隔で2回接種																								
	日本脳炎	1期	1期初回接種を6日から28日までの間隔で2回接種後、概ね1年後に1期追加接種を1回接種																								
2期																											
子宮頸がん ※女性のみ																											
任意接種	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	<p>※予防効果を確実にするため、日本小児科学会は5~6歳に2回目の接種を推奨しています。</p> <p>(注：助成開始予定(開始時期は未定))</p>																								有料 (一部助成)	

標準的な接種期間(病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間) 法で定められている接種対象期間 接種券発送時期