＜岡崎市予防接種スケジュール表＞

岡崎市では下記の予防接種を実施しています。（制度改正により変更する場合がありますので毎年確認してください）
今後、対象年齢にあわせて随時接種券を送付します。接種券には使用期間があります。内容を確認の上、早めに接種をしましょう。

		2カ月	3カ月	5カ月	6カ月	8カ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	7歳半	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳	料金
定期接種	ロタ	１価（ロタリックス）：標準的な接種として、初回接種は生後2か月から開始。27日以上の間隔で２回接種。（接種期間終了日は24週まで） ５価（ロタテック）：標準的な接種として、初回接種は生後2か月から開始。27日以上の間隔で３回接種。（接種期間終了日は32週まで） （注：初回の標準的な接種期間） ※どちらのワクチンも初回接種は14週6日までに受けることが推奨されています。																							無料
	小児用肺炎球菌	標準的な接種として、初回接種を27日以上の間隔で３回接種（1歳未満）後、60日以上あけて追加接種を１回接種（１歳以上）※初回接種開始月齢により接種方法が異なります。																							
	B型肝炎	標準的な接種として、27日以上の間隔で２回。接種後３回目は、１回目の接種から139日以上あけて１回接種																							
	五種混合（ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ）１期	1期初回接種を20日から56日までの間隔で3回接種後、6か月以上経過したのちに1期追加接種を1回接種。　※既にヒブ、四種混合ワクチンの接種歴がある方は担当までご連絡ください。																							
	BCG																								
	二種混合（ジフテリア 破傷風）２期																								
	麻しん 風しん（MR）１期																								
	麻しん 風しん（MR）２期	小学校就学前の１年間（年長児の4/1～3/31）																							
	水痘（水ぼうそう）	標準的な接種として、６月から12月の間隔で２回接種																							
	日本脳炎 １期	１期初回接種を６日から２８日までの間隔で２回接種後、概ね１年後に１期追加接種を１回接種																							
	日本脳炎 ２期																								
	子宮頸がん ※女性のみ																								
任意接種	おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）	（小学校就学前の１年間（年長児の4/1～3/31）） 麻しんや風しんは、幼児期早期にかかってしまうことが多いため、お母さんからの免疫がなくなる生後１歳以降なるべく早く接種を受けましょう。																							有料（一部助成）

標準的な接種期間（病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間）　法で定められている接種対象期間　接種券発送時期

【岡崎市保健部ワクチン接種推進室　TEL：（０５６４）２３－６７１４　FAX：２３－６６２１】（R6.5月～）