

<岡崎市予防接種スケジュール表>

岡崎市では下記の予防接種を実施しています。（制度改正により変更する場合がありますので毎年確認してください）

今後、対象年齢にあわせて随時接種券を送付します。接種券には**使用期間**がありますので、内容を確認の上、早めに接種をしましょう。

		2	3	5	6	8	1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	料金	
		カ	カ	カ	カ	カ	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳	歳		
		月	月	月	月	月								半												
定期接種	ヒブ	標準的な接種として、初回接種を27～56日までの間隔において3回接種後、7カ月後に追加接種を1回接種 ※初回接種開始月齢により接種方法が異なります。																							無料	
	小児用肺炎球菌	標準的な接種として、初回接種を27日以上の間隔において3回接種（1歳未満）後、60日以上の間隔において追加接種を1回接種（1歳以上） ※初回接種開始月齢により接種方法が異なります。																								
	B型肝炎	標準的な接種として、27日以上の間隔で2回、更に、1回目の接種から139日以上の間隔において1回接種																								
	四種混合 （シフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ）	1期	1期初回接種を20日から56日までの間隔で3回接種後、概ね1年後に1期追加接種を1回接種																							
	BCG																									
	二種混合 （シフテリア 破傷風）	2期																								
	麻しん 風しん （MR）	1期																								
		2期	小学校就学前の1年間（年長児の4/1～3/31）																							
	水痘（水ぼうそう）	標準的な接種として、6月から12月の間隔において2回接種																								
	日本脳炎	1期	1期初回接種を6日から28日までの間隔で2回接種後、概ね1年後に1期追加接種を1回接種																							
2期																										
子宮頸がん ※女性のみ																										
任意接種	ロタ	1価（ロタリックス）：生後6週～24週までの間に4週間で2回接種 5価（ロタテック）：生後6～32週までの間に4週間隔で3回接種																							有料 （一部助成）	
	おたふくかぜ （流行性耳下腺炎）	日本小児科医学会推奨の接種期間 （注：助成はありません）																								

病気にかからないように早く予防接種に連れて行ってね！



平成30年6月から
おたふくかぜ予防接種の一部助成開始！
※1歳のかたに1回助成。

■ 標準的な接種期間（病気にかかりやすい時期を考慮して定められた期間） □ 法で定められている接種対象期間 ↓ 接種券発送時期

◎ 麻しん又は風しん予防接種第1期は標準的な接種期間はありませんが、麻しんや風しんは幼児期早期にかかってしまうことが多いため、お母さんからの免疫がなくなる生後1歳以降なるべく早期に接種を受けましょう。