

令和6年度

ごみ質分析

| ごみを採取した月日       |                          | 4月5日  | 5月2日 | 6月25日 | 7月5日 | 8月1日  | 9月6日  | 10月4日  | 11月1日  | 12月6日 | 1月6日 | 2月7日 |  |
|-----------------|--------------------------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|--------|-------|------|------|--|
| 測定結果の得られた月日     |                          | 4月26日 | 6月3日 | 7月17日 | 8月8日 | 8月28日 | 9月30日 | 10月31日 | 11月29日 | 1月6日  | 2月3日 | 3月6日 |  |
| ごみの種類組成         | 紙、布類 (%)                 | 42.7  | 27.3 | 29.7  | 11.7 | 20.5  | 26.1  | 29.2   | 10.6   | 22.4  | 45.5 | 48.3 |  |
|                 | ビニール、合成樹脂、<br>ゴム、皮革類 (%) | 9.5   | 12.5 | 18.0  | 12.7 | 17.0  | 15.5  | 23.5   | 13.5   | 15.1  | 23.0 | 9.6  |  |
|                 | 木、竹、わら類 (%)              | 32.4  | 46.5 | 39.9  | 68.0 | 47.1  | 48.0  | 34.0   | 68.8   | 43.2  | 3.3  | 16.6 |  |
|                 | ちゅう芥類 (%)                | 2.9   | 7.0  | 6.5   | 1.3  | 5.7   | 7.0   | 4.1    | 1.6    | 13.7  | 18.3 | 9.5  |  |
|                 | 不燃物類 (%)                 | 2.9   | 1.4  | 0.7   | 0.3  | 2.1   | 0.6   | 3.8    | 1.3    | 0.4   | 2.9  | 7.3  |  |
|                 | その他 (%)                  | 9.6   | 5.3  | 5.2   | 6.0  | 7.6   | 2.8   | 5.4    | 4.2    | 5.2   | 7.0  | 8.7  |  |
| 単位容積重量 (kg/m3)  |                          | 147   | 139  | 146   | 116  | 142   | 121   | 148    | 153    | 184   | 153  | 188  |  |
| ごみの3成分          | 水分 (%)                   | 40.2  | 49.1 | 50.4  | 54.2 | 39.6  | 51.6  | 38.5   | 25.3   | 56.7  | 36.8 | 56.7 |  |
|                 | 灰分 (%)                   | 8.3   | 6.1  | 5.2   | 6.1  | 12.9  | 3.5   | 10.4   | 6.9    | 3.7   | 8.3  | 6.1  |  |
|                 | 可燃物 (%)                  | 51.5  | 44.8 | 44.4  | 39.7 | 47.5  | 44.9  | 51.1   | 67.8   | 39.6  | 54.9 | 37.2 |  |
| 低位発熱量 (kcal/kg) |                          | 2200  | 1920 | 1790  | 1580 | 2100  | 1970  | 2460   | 3140   | 1660  | 2670 | 1280 |  |